

Coxiella burnetii fase II IgG

Beschrijving van de test

Naam:	Coxiella burnetii fase II IgG
Synoniemen:	Q-fever, Q-koorts, opsporen van fase I en fase II IgG- en IgM-antistoffen
Intern codenummer:	9762
Frequentie:	1-2x per week
Uitvoerend labo:	Instituut Tropische Geneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	1 week

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Zonder klinisch informatie en de datum van het begin van de symptomen is interpretatie van de test niet mogelijk.
Conditionering & verzending:	Serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).
Bijaanvraag/stabiliteit:	24

Analyse

Analysemethode:	LAB ITG
Domein:	Scheikunde

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	1/64	1/64

Tarificatie

Nomenclatuur: 551176 - 551180 B 250 Opsporen van antilichamen tegen Rickettsiae met gebruik van specifieke antigenen #(Maximum 4)(Cumulregel [327](#))

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel [328](#))

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

08-01-2026

Tessa Baert