

Adenovirus IgG antistof

Beschrijving van de test

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Naam: | Adenovirus IgG antistof |
| Intern codenummer: | 952 |
| Uitvoerend labo: | Algemeen Medisch Labo Antwerpen |

Afname van het materiaal

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Voorkeur materiaal: | serum |
| Aanvraagformulier: | Aanvraagformulieren |
| Afnameinstructies: | Afname instructies |
| Bijaanvraag/stabiliteit: | 7 dagen |

Analyse

| | |
|------------------------|--|
| Analysemethode: | LAB AML |
| Domein: | Verzendingen Scheikunde |
| Bijkomende informatie: | In tegenstelling tot wat de naam zou kunnen laten vermoeden is adenovirus GEEN typische verwekker van klierkoorts. |

Gezien de meeste (jong-)volwassenen reeds contact hebben gehad met adenovirus (en dus IgG positief zijn) zal bij een herinfectie met het adenovirus (door bv. een ander serotype) er quasi geen IgM respons meer optreden. Bijgevolg kan enkel mogelijk een IgG titerstijging over de tijd heen worden gezien. Gezien er eveneens relatief frequent vals positieve adenovirus IgM resultaten optreden, is een opvolgstaal na minstens 2, en bij voorkeur 3 à 4 weken derhalve steeds noodzakelijk om een infectie met adenovirus vast te stellen (titerwijzigingen IgG?). Voor de diagnostiek van respiratoire adenovirus infecties wordt bij voorkeur een respiratoire wisser afgenomen voor ofwel de antigenetectie of voor een PCR bepaling.

Tarificatie

Nomenclatuur: 551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

04-11-2025

Hilde Vanneste

Copyright © 2026 All rights reserved.