

ethosuximide

Beschrijving van de test

Naam:	ethosuximide
Synoniemen:	Zarontin®, Ethymal®, Acrisuccine®
Intern codenummer:	9241
Frequentie:	3 x per week
Uitvoerend labo:	Klinisch Laboratorium ZAS Middelheim
Antwoordtijd (TAT):	1 week

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	250 µl
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB ZAS
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	mg/L
Bijkomende informatie:	Spiegelafname is mogelijk vanaf 1-2 weken na de start van de behandeling na bereiken van de steady state, preferentieel als dalwaarde voor de volgende gift.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	40-100 mg/L	40-100 mg/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 548096 - 548100 B 350 Dosereren van een anti-epileptisch geneesmiddel #(Maximum 3)(Diagnosereg^{el} [46](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

548295 - 548306 B 1600 Dosereren van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) #(Maximum 2)(Diagnose 46)
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

05-01-2026

Tessa Baert