

SARS-CoV-2 spike IgG

Beschrijving van de test

Naam:	SARS-CoV-2 spike IgG
Synoniemen:	SARS-CoV-2 AS (N = nucleocapside, S = spike), Totale antilichamen tegen SARS-CoV-2 (IgA+IgM+IgG) tegen nucleocapside eiwit; Totale antilichamen tegen SARS-CoV-2 (IgA + IgM + IgG) tegen spike eiwit
Frequentie:	maandag t/m vrijdag
Uitvoerend labo:	AZ St.-Jan Labo Biochemie
Antwoordtijd (TAT):	1 week
Verantwoordelijk bioloog:	Dieter De Smet

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 buis
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB AZ St.-Jan Brugge
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	BAU/mL
Bijkomende informatie:	9387: - Gehospitaliseerde patiënten met een suggestief klinisch beeld voor COVID-19 waarbij er discrepantie is tussen de moleculaire opsporingstest en een CT-scan, minimum 7 dagen na de start van de symptomen - Ambulante of gehospitaliseerde patiënten die een suggestief en langdurig klinische beeld hebben voor COVID-19 maar een negatief resultaat op de moleculaire test verkregen of niet binnen de 7 dagen na de start van de symptomen konden getest worden via een moleculaire test, minimum 14 dagen na de start

van de symptomen

- Ambulante of gehospitaliseerde patiënten in de context van differentiële diagnose bij een atypische klinische presentatie, minimum 14 dagen na de start van de symptomen
- Zorgverleners en personeel, werkzaam in ziekenhuizen, klinische laboratoria of collectiviteiten, met een hoge besmettingsgraad (COVID diensten, woonzorgcentra of klinische laboratoria), in het kader van lokaal risicomanagement

R9387:

- Arbeidsgeneeskundige en epidemiologische doeleinden (niet vergoed door RIZIV en zal aan de patiënt aangerekend worden)
- Voldoet niet aan bovenstaande definities, Curiosity testing patiënten (niet vergoed door RIZIV en zal aan de patiënt aangerekend worden).

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.0-50.0 BAU/mL	0.0-50.0 BAU/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 22/03/2026

Laatst gewijzigd op

05-01-2026

Tessa Baert