

Adenovirus IgM & IgG

Beschrijving van de test

Naam:	Adenovirus IgM & IgG
Intern codenummer:	952
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	Algemeen Medisch Labo Antwerpen
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	1 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB AML
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Bijkomende informatie:	In tegenstelling tot wat de naam zou kunnen laten vermoeden is adenovirus GEEN typische verwekker van klierkoorts.

Gezien de meeste (jong-)volwassenen reeds contact hebben gehad met adenovirus (en dus IgG positief zijn) zal bij een herinfectie met het adenovirus (door bv. een ander serotype) er quasi geen IgM respons meer optreden. Bijgevolg kan enkel mogelijk een IgG titerstijging over de tijd heen worden gezien. Gezien er eveneens relatief frequent vals positieve adenovirus IgM resultaten optreden, is een opvolgstaal na minstens 2, en bij voorkeur 3 à 4 weken derhalve steeds noodzakelijk om een infectie met adenovirus vast te stellen (titerwijzigingen IgG?). Voor de diagnostiek van respiratoire adenovirus infecties wordt bij voorkeur een respiratoire wisser afgenomen voor ofwel de antigenetectie of voor een PCR bepaling.

Tarificatie

Nomenclatuur: 551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

24-02-2026

Tessa Baert

Copyright © 2026 All rights reserved.