

## Flucloxacilline absorptietest

### Beschrijving van de test

Naam:	Flucloxacilline absorptietest
Intern codenummer:	9396
Frequentie:	3x per week
Uitvoerend labo:	Centraal Labo UZ Gent
Antwoordtijd (TAT):	1 week

### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	heparine plasma zonder gel
Volume:	50 µl
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Aandachtspunten:	VOLWASSEN patiënten behandeld met flucloxacilline met intermittente infusie van 30 minuten 2 g q4h wordt één geplande flucloxacilline IV toediening vervangen door een orale toediening van 1 g flucloxacilline volgens onderstaand schema.

PEDIATRISCHE patiënten behandeld met flucloxacilline dosis 37.5 mg/kg 4x/dag (afronden op maximale dosis van 1.5 g 4x/dag) voor botinfecties wordt één geplande flucloxacilline IV toediening vervangen door een orale toediening van 37.5 mg/kg (afronden op maximale dosis van 1.5 g) volgens onderstaand schema.

#### SCHEMA;

t=0 min: spiegel 0min afnemen vlak voor geplande dosis en hierna onmiddellijk inname orale testdosis

- volwassenen: 1 g PO flucloxacilline (=2 capsules Floxapen 500 mg)

- kinderen: 37.5 mg/kg PO flucloxacilline (afronden op maximale dosis van 1.5 g)

t=45 min: spiegel 45min afnemen

t=90 min: spiegel 90min afnemen, hierna einde test

De patiënt moet 'nuchter' zijn voor de test (= 2 u voor tot 1 u na

de inname van de testdosis geen voedsel of dranken, uitz. water). Overige medicatie mag worden ingenomen. Er mag geen flucloxacilline IV worden toegediend tijdens de uitvoering van de test. Na uitvoering van de absorptietest mag de volgende IV toediening plaatsvinden zoals gepland.

Noteer de afnametijdstippen op de tubes!

Bezorg zo snel als mogelijk aan het labo.

Conditionering & verzending:

Labo:

centrifugeer de tubes en pipetteer het plasma in gelabelde tubes (epjes).

3 buisjes heparineplasma (na 0min, 45min en 90min, gelabeld met identificatie en tijdstip afname!) ingevroren opsturen.

Bijaanvraag/stabiliteit:

24u

## Analyse

Analysemethode:

LAB UZ Gent

Domein:

Scheikunde

Eenheid:

mg/L

Bijkomende informatie:

Flucloxacilline heeft een grote interindividuele absorptie bij orale toediening. Na adequate intraveneuze therapie is nabehandeling met flucloxacilline PO enkel mogelijk na een geslaagde flucloxacilline absorptietest

## Tarificatie

Nomenclatuur:

548715 - 548726 B 350 Doseren van een antibioticum  
##(Maximum 2)(Cumulregel [75](#))(Diagnoseregel [46](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

03-02-2026

Emmanuel De Laere