

iso alkalische fosfatasen

Beschrijving van de test

Naam:	iso alkalische fosfatasen
Synoniemen:	iso-AF, iso-alkalische fosfatase, AF iso-enzymen
Intern codenummer:	411
Frequentie:	minstens 1x per week
Uitvoerend labo:	Algemeen Medisch Labo Antwerpen
Antwoordtijd (TAT):	14 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	0,2mL
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Conditionering & verzending:	Staal diepgevroren versturen
Bijaanvraag/stabiliteit:	niet mogelijk

Analyse

Analysemethode:	LAB AML
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Bijkomende informatie:	<p>De referentiewaarden variëren volgens geslacht en leeftijd. Het serum van volwassenen bevat hoofdzakelijk lever- en een kleine botfractie.</p> <p>Tijdens de lengtegroei van de beenderen bestaat er een fysiologische stijging van de botfractie met pieken tijdens het eerste levensjaar en de puberteit.</p> <p>De beenfractie is verhoogd bij botfractuur, osteolytische aandoeningen, bottumor, botmetastase, ziekte van Paget, hyperparathyroidie, hyperthyroidie en transiënte hypofosfatemie.</p>

De leverfractie is verhoogd bij lever- en galblaaspathologie.
De intestinale fractie en intestinale variant komen o.a. voor bij personen met bloedgroep O en B (5%), na een vetrijke maaltijd, bij autoimmuunziekten (diabetes, SLE,..), bij weefselregeneratie (postoperatief, leveraandoeningen, tumor, chronisch diarree) en bij dialysepatiënten.
De placentaire fractie duidt steeds op (re)generatie van weefsel. Dit komt o.a. voor tijdens de zwangerschap, bij weefseldestructie en tumoren (cervix-, ovarium-, testistumor en teratoma).

Tarificatie

Nomenclatuur: 542894 - 542905 B 400 Dosereren van de botaanmaak
#(Maximum 1) (Cumulregel [77](#)) (Diagnoseregel [71](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

12-01-2026

Kelly Derore