

Anaplasma phagocytophilum IgG

Beschrijving van de test

Naam:	Anaplasma phagocytophilum IgG
Synoniemen:	ehrlichiose
Intern codenummer:	9204
Frequentie:	1 x per week
Uitvoerend labo:	Militair Hospitaal Kon. Astrid
Antwoordtijd (TAT):	10 dagen

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Toegelaten materiaal:	serologie wordt altijd samen met PCR uitgevoerd: 1 serumbuis (min. 2 mL bloed) + 1 EDTA-buis (min. 3 mL bloed, primaire niet gebruikte tube om contaminatie te vermijden!)
Volume:	3 ml + 2 ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Criteria voor het uitvoeren van deze analyse door het Nationaal Referentiecentrum: *mogelijkheid van recente blootstelling aan teken + koorts + tenminste één van volgende symptomen: - hoofdpijn - spierpijn - leucopenie / thrombocytopenia / anemia - stijging lever transaminasen / hepatitis - nausea / braken / anorexie - rash *Morulae in het cytoplasma van neutrofielen of monocysten tijdens microscopisch onderzoek *Recente positieve of twijfelachtige serologie. Vermeld klinische en epidemiologische informatie op het aanvraagformulier NRC Anaplasma. De bloedafname uitvoeren alvorens een antibioticatherapie te starten. Niet conforme stalen of stalen zonder volledig ingevuld NRC aanvraagformulier worden niet aanvaard.

https://www.sciensano.be/sites/default/files/aanvraagformulier_anaplasma.pdf

Conditionering &
verzending:

De stalen mogen bij KT worden verzonden.

De transittijd moet zo kort mogelijk worden gehouden. (vermijd
transport tijdens het weekend of feestdagen)

Bijaanvraag/stabiliteit:

7 dagen

Analyse

Analysemethode:

LAB Militair Hospitaal

Domein:

Verzendingen Scheikunde

Bijkomende informatie:

Bijkomende relevante klinisch informatie is: koorts, tekenbeet,
thrombocytentelling, SGOT en SGPT.

Laatst gewijzigd op

06-02-2026

Tessa Baert