

tobramycine (piek)

Beschrijving van de test

Naam:	tobramycine (piek)
Synoniemen:	TOBD, TOBP, Obracin®
Intern codenummer:	394 (dal) 395 (piek)
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	UZ Leuven Laboratoriumgeneeskunde
Antwoordtijd (TAT):	1 dag

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Toegelaten materiaal:	heparineplasma zonder gel
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Dal: staal afnemen juist vóór toediening van de volgende dosis Piek: staal afnemen 1u na intramusculaire toediening. Bij IV toediening het bloedstaal afnemen 30 min na het einde van een infuus over 30 min. Dosis en frequentie (... mg om de ... uur) vermelden bij de aanvraag.
Conditionering & verzending:	bewaring tot verzending: koelkast
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB UZ Leuven
Domein:	Scheikunde
Eenheid:	mg/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	16-24 mg/L	16-24 mg/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 548715 - 548726 B 350 Doseran van een antibioticum
##(Maximum 2)(Cumulregel [75](#))(Diagnoseregel [46](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

03-04-2026 Freya Van de Steen