

B2GP1 IgG

Beschrijving van de test

Naam:	B2GP1 IgG
Intern codenummer:	9328
Frequentie:	Wekelijks of 2-wekelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	Maximum 2 weken
Verantwoordelijk bioloog:	An-Sofie Decavele

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Citraatplasma
Toegelaten materiaal:	Citraatbuis stolling
Volume:	1 buis
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Bijaanvraag/stabiliteit:	4u

Analyse

Analysemethode:	QUANTA Link Rumbeke
Domein:	Stolling
Eenheid:	U/ml
Bijkomende informatie:	Anti-cardiolipine en beta-2-glycoproteïne 1 IgG en IgM antistoffen worden aangevraagd in het kader van de diagnose van het antifosfolipiden syndroom. Om de diagnose te stellen moet voldaan worden aan zowel klinische criteria (trombose of zwangerschapscomplicaties) als aan laboratoriumcriteria (positieve ACA's en/of anti-B2GP1 antistoffen en/of lupus anticoagulans). Een positief resultaat moet steeds bevestigd worden na een interval van 12 weken (Sydney criteria, 2009).

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

20.0 U/ml

20.0 U/ml

Tarificatie

Nomenclatuur:

553291 - 553302 B 700 Bepalen van anti-bèta2-glycoproteïne
antistoffen (IgG of IgM) #(Maximum 2) (Diagnoseregel [106](#))
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

03-02-2026

Emmanuel De Laere

Copyright © 2026 All rights reserved.