

## B2GP1 IgM

### Beschrijving van de test

Naam:	B2GP1 IgM
Intern codenummer:	9328
Frequentie:	Wekelijks of 2-wekelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	Maximum 2 weken
Verantwoordelijk bioloog:	An-Sofie Decavele

### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Citraatplasma
Toegelaten materiaal:	Citraatbuis stolling
Volume:	1 buis
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Bijaanvraag/stabiliteit:	4u

### Analyse

Analysemethode:	QUANTA Link Rumbeke
Domein:	Stolling
Eenheid:	U/ml
Bijkomende informatie:	Anti-cardiolipine en beta-2-glycoproteïne 1 IgG en IgM antistoffen worden aangevraagd in het kader van de diagnose van het antifosfolipiden syndroom. Om de diagnose te stellen moet voldaan worden aan zowel klinische criteria (trombose of zwangerschapscomplicaties) als aan laboratoriumcriteria (positieve ACA's en/of anti-B2GP1 antistoffen en/of lupus anticoagulans). Een positief resultaat moet steeds bevestigd worden na een interval van 12 weken (Sydney criteria, 2009).

## Referentiewaarden

**Leeftijd**

**Mannen**

**Vrouwen**

20.0 U/ml

20.0 U/ml

## Tarificatie

Nomenclatuur:

553291 - 553302 B 700 Bepalen van anti-bèta2-glycoproteïne  
antistoffen (IgG of IgM) #(Maximum 2) (Diagnoseregel [106](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

03-02-2026

Emmanuel De Laere