

Chlamydia trachomatis antilichamen in bloed

Beschrijving van de test

Naam:	Chlamydia trachomatis antilichamen in bloed
Synoniemen:	CTraA, CTraG, CTraM
Intern codenummer:	963 (10 jaar: IgG + IgM; >10 jaar: IgG + IgA)
Frequentie:	2x per week
Uitvoerend labo:	AZ St.-Jan Labo Biochemie
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Volume:	0.5ml
Aanvraagformulier:	Aanvraagformulieren
Afnameinstructies:	Afname instructies
Aandachtspunten:	Interferentie door hemolyse en contract van het bloed met glas.
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

Analyse

Analysemethode:	LAB AZ St.-Jan Brugge
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Bijkomende informatie:	Dit is een panel: 10 jaar: IgG + IgM >10 jaar: IgG + IgA

De Chlamydia's zijn een familie van bacteriën die verantwoordelijke zijn voor genitale infecties, luchtweg- en ooginfecties. De genitale chlamydia-infectie wordt overgedragen door seksueel contact en komt vaak voor. Deze ziekte is vaak asymptomatisch bij vrouwen, maar kan in geval van langdurige aantasting van de eileiders tot steriliteit leiden.

Chlamydia trachomatis is een bacterie die zich langs seksuele weg verspreidt, via rechtstreeks contact met afscheidingsvocht van besmette personen of met materiaal met vlekken van afscheidingsvocht. Zij is verantwoordelijk voor genitale en ooginfecties (trachoom).

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Negatief

Negatief

Tarificatie

Nomenclatuur:

551972 - 551983 B 200 Opzoeken van Chlamydia antilichamen
#(Maximum 3)(Cumulregel [327](#))(Diagnoseregel [74](#))

Bron: RIZIV website op 26/05/2026

Laatst gewijzigd op

04-05-2026

Tessa Baert