

### immunotypering

#### Beschrijving van de test

Naam:	immunotypering
Synoniemen:	immunofixatie
Intern codenummer:	38
Frequentie:	Dagelijks (weekdagen)
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	3 dagen
Verantwoordelijk bioloog:	Inge De Cuyper

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Serum
Volume:	100 µL
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Aandachtspunten:	Wordt slechts uitgevoerd als de gewone elektroforese een abnormale fractie toont.
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

#### Analyse

Analysemethode:	Capillarys Rumbeke
Domein:	Scheikunde
Bijkomende informatie:	<p>Immunofixatie wordt in de routine enkel gebruikt voor de identificatie van eiwit abnormaliteiten, vooral van monoclonale fracties.</p> <p>Deze ziektebeelden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van paraproteïnen in het serum die ontstaan door monoclonale proliferatie van B cellen. Daarbij kunnen zowel intacte als fragmenten van immunoglobuline moleculen geproduceerd worden. Voorbeelden daarvan zijn de ziekte van Waldenström (macroglobulinemie) en het Multipel Myeloom.</p>

## Tarificatie

Nomenclatuur: 540470 - 540481 B 900 Immunoëlectroforese gebruik makend van minimum drie antihumane immunosera #(Maximum 1) (Cumulregel [49](#)) (Diagnoseregel [8](#))  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

10-04-2026

Saartje Gijbels

Copyright © 2026 All rights reserved.