

### Pregabaline

#### Beschrijving van de test

Naam:	Pregabaline
Synoniemen:	Lyrica®
Intern codenummer:	9265
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	AZ Groeninge Labo Toxicologie
Antwoordtijd (TAT):	2 weken

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	Serum
Toegelaten materiaal:	heparineplasma
Volume:	250 µl
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Conditionering & verzending:	Bewaring in de koelkast tot verzending op kamertemperatuur.
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

#### Analyse

Analysemethode:	LAB AZ Groeninge
Domein:	Verzendingen Scheikunde
Eenheid:	mg/L
Bijkomende informatie:	Indicaties voor het gebruik van pregabaline: <ul style="list-style-type: none"><li>- Anti-epilepticum met een nauw spectrum: focale epilepsie-aanvallen met of zonder secundair veralgemeende aanvallen (steeds als add-on-behandeling).</li><li>- Neuropathische pijn.</li><li>- Veralgemeende angst bij volwassenen.</li></ul> Ongewenste effecten: <ul style="list-style-type: none"><li>- Vooral gewichtstoename, perifere oedeem, duizeligheid, slaperigheid, ataxie, tremor, moeheid, hoofdpijn, gewrichtspijn, impotentie, visusstoornissen.</li></ul>

- Verhoogd risico van ademhalingsdepressie en hartritme stoornissen.
- Toename van suïcidedachten, suïcide, slaperigheid overdag, agressiviteit.
- Risico van afhankelijkheid en misbruik; voorzichtigheid is derhalve geboden bij een voorgeschiedenis van drugs- en geneesmiddelenmisbruik. Pregabaline versterkt het euforisch effect van opioïden, de sedatie en de respiratoire depressie.

## Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	2.0-8.0 mg/L	2.0-8.0 mg/L

## Tarificatie

Nomenclatuur: 548295 - 548306 B 1600 Doseran van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) #(Maximum 2)(Diagnose 46)  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

16-01-2026

Evelien Debaeke