

### AMA IIF (anti-mitochondriën)

#### Beschrijving van de test

Naam:	AMA IIF (anti-mitochondriën)
Synoniemen:	mitochondriën antistoffen, anti-M2
Intern codenummer:	287
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	max. 1 week
Verantwoordelijk bioloog:	An-Sofie Decavele

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Toegelaten materiaal:	serum
Volume:	500 µL
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

#### Analyse

Analysemethode:	QUANTA Link Rumbeke
Domein:	Niet-infectieuze serologie
Bijkomende informatie:	<p>De aanwezigheid van AMA is een hoofdkenmerk van PBC (Primaire Billiaire Cirrhosis). Onder de vele AMA zijn de M2 antilichamen tegen het Pyruvaat Dehydrogenase enzyme Complex (PDC) de meest belangrijke. Het is onduidelijk of de auto-antilichamen pathogeen zijn.</p> <p>PBC is een auto-immuun aandoening van de lever met ongekende etiologie. De ziekte wordt vooral bij vrouwen gezien. De progressieve destructie van de galkanalen resulteren in levercirrose. De parameters die moeten worden nagegaan in het lab zijn de volgende :</p>

- verhoogde leverenzymes
- verhoogde alkalische fosfatase
- verhoging van IgM (IgG en IgA ongeveer normaal)
- sterk positieve AMA (M2 bij > 95% van de PBC patiënten)

## Tarificatie

Nomenclatuur: 555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (Maximum vier organen) #(Maximum 4)  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

10-04-2026

Saartje Gijbels