

### ASM IIF (anti-gladde spier)

#### Beschrijving van de test

Naam:	ASM IIF (anti-gladde spier)
Synoniemen:	SMA: anti-gladde spiercel antistoffen, anti smooth muscle, anti-actine
Intern codenummer:	288
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	Campus Rumbeke
Antwoordtijd (TAT):	max. 1 week
Verantwoordelijk bioloog:	An-Sofie Decavele

#### Afname van het materiaal

Voorkeur materiaal:	serum
Toegelaten materiaal:	serum
Volume:	500 µL
Aanvraagformulier:	<a href="#">Aanvraagformulieren</a>
Afnameinstructies:	<a href="#">Afname instructies</a>
Bijaanvraag/stabiliteit:	7 dagen

#### Analyse

Analysemethode:	QUANTA Link Rumbeke
Domein:	Niet-infectieuze serologie
Bijkomende informatie:	anti-SMA worden geassocieerd met auto-immuunhepatitis en zijn in ongeveer 50% aanwezig bij patiënten met AIH type 1, dit in hoge titer. SMA antistoffen zijn echter niet ziekte-specifiek, lagere titers/intensiteit wordt geassocieerd met virale infecties, PBC, alcoholische leverziekte en neoplasie, in beperkte mate kan dit ook voorkomen bij de gezonde populatie.

## Tarificatie

Nomenclatuur: 555951 - 555962 B 300 Opzoeken van antiweefselantilichamen door immunofluorescentie, per orgaan (Maximum vier organen) #(Maximum 4)  
Bron: RIZIV website op 26/05/2026

## Laatst gewijzigd op

10-04-2026

Saartje Gijbels

Copyright © 2026 All rights reserved.